

大腸

レジメン名		IFL（大腸癌・治癒切除不能な進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説	転移性・進行大腸癌に対する標準的化学療法の1つ。	1コース		内服・その他内容		
		42日				
備考		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イリノテカン		125mg/m ²		90分で点滴		day1,8,15,22
レボホリナート		10mg/m ²		全開で点滴		day1,8,15,22
フルオロウラシル		500mg/m ²		全開で点滴		day1,8,15,22

レジメン名		BV+FOLFOXIRI（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説	切除不能／進行・再発直腸・結腸癌に対する標準的化学療法。	1コース		内服・その他内容		
		14日				
備考	全量130mLのインフューザーポンプを使用。	催吐リスク				
		高				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1
イリノテカン		165mg/m ²		90分で点滴		day1
オキサリプラチン		85mg/m ²		120分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
フルオロウラシル		3200mg/m ²		48時間で点滴		day1

レジメン名		FOLFOXIRI（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説	切除不能／進行・再発直腸・結腸癌に対する標準的化学療法。	1コース		内服・その他内容		
		14日				
備考	全量130mLのインフューザーポンプを使用。	催吐リスク				
		高				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イリノテカン		165mg/m ²		90分で点滴		day1
オキサリプラチン		85mg/m ²		120分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
フルオロウラシル		3200mg/m ²		48時間で点滴		day1

レジメン名		アフリベルセプト+FOLFIRI（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説	進行・再発大腸癌に対する化学療法のひとつ。	1コース		内服・その他内容		
		14日				
備考		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
アフリベルセプト		4mg/kg		60分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
イリノテカン		180mg/m ²		90分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴		day1

レジメン名	ラムシルマブ+FOLFIRI（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌
解説備考	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ラムシルマブ		8mg/kg	60分で点滴	day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1
イリノテカン		150mg/m ²	90分で点滴	day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1
レジメン名	ニボルマブ（ホジキンリンパ腫）		癌種	大腸癌
解説備考	再発難治性の古典的ホジキンリンパ腫の治療法のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1
レジメン名	ニボルマブ（MSI-High大腸癌）		癌種	大腸癌
解説備考	MSI-Highを有する結腸・直腸癌の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body	30分で点滴	day1
レジメン名	（PER+HER）皮下注		癌種	大腸癌
解説備考		1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
フェスゴIN		30000U/15mL	8分以上かけて皮下注	day1【初回】
フェスゴMA		20000U/10mL	5分以上かけて皮下注	day1【2回目以降】
レジメン名	BV+CPT-11		癌種	大腸癌
解説備考	大腸癌に対する化学療法の1つで、2nd、3rd lineで多用されている	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ペバシズマブ		5mg/kg	30-90分	day1
イリノテカン		150mg/m ²	90分(遮光)	day1

レジメン名		sLV5FU2		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		軽				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴		day1

レジメン名		Biweekly CPT-11（大腸癌・進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する化学療法の1つで、2nd、3rd lineで多用されている。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イリノテカン		150mg/m ²		90分で点滴		day1

レジメン名		RT+5-FU+MMC（肛門癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	肛門癌の標準的治療。	1コース	内服・その他内容			
		28日				
		催吐リスク				
		軽	RT（45Gy/25fx）2コース。2コース終了後に腫瘍残存があれば3コース目追加もしくはCDDP+5-FUを1コース追加する。			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
マイトマイシンC		10mg/m ²		15分で点滴		day1
フルオロウラシル		1000mg/m ²		24時間で点滴		day1-4

レジメン名		S-1+BV（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行大腸癌の標準治療の一つ。	1コース	内服・その他内容			
		42日				
		催吐リスク				
		軽	S-1：体表面積1.25未満で40mg/day、1.25-1.5で50mg/day、1.5以上で60mg/day 分2食後 day1-28			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ペバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1,15,29

レジメン名		SOX（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容			
		21日				
		催吐リスク				
		中	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後【day1夕-15朝】			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴		day1

レジメン名		BV+XELOX（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する標準的レジメンの1つ。	1コース	内服・その他内容			
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、			
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で			
		中	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		7.5mg/kg		30-90分で点滴		day1
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴		day1

レジメン名		XELOX（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する標準的レジメンの1つ。	1コース	内服・その他内容			
		21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、			
		催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で			
		中	3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 分2食後			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴		day1

レジメン名		BV（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対し、複数のレジメンと併用して用いる。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		最小				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5-10mg/kg		30-90分で点滴		day1

レジメン名		アバスチン+FOLFIRI（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
アバスチン		5mg/kg		30-90分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
イリノテカン		150mg/m ²		90分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴		day1

レジメン名		アバスチン+mFOLFOX6（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
アバスチン		5mg/kg		30-90分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
オキサリプラチン		85mg/m ²		120分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴		day1

レジメン名		mFOLFOX6（進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法。		1コース	内服・その他内容		
			14日			
			催吐リスク			
			中			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
オキサリプラチン		85mg/m ²		120分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴		day1
レジメン名		2週毎 パニツムマブ（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する標準的治療の1つ。		1コース	内服・その他内容		
			14日			
			催吐リスク			
			最小			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
パニツムマブ		6mg/kg		60-90分で点滴		day1
レジメン名		IRIS（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する汎用化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容 S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後 【day1夕-15朝】		
			28日			
			催吐リスク			
			中			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イリノテカン		125mg/m ²		90分で点滴		day1,15
レジメン名		Weekly CPT-11（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	肺癌、乳癌、大腸癌、胃癌、子宮頸癌、卵巣癌に対する汎用化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容		
			28日			
			催吐リスク			
			中			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イリノテカン		100mg/m ²		90分で点滴		day1,8,15
レジメン名		3週毎 BV+IRIS（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する臨床第Ⅲ相試験で使用するレジメン。		1コース	内服・その他内容 S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後 【day1夕-15朝】		
			21日			
			催吐リスク			
			中			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ペバシズマブ		7.5mg/kg		30-90分で点滴		day1
イリノテカン		150mg/m ²		90分で点滴		day1

レジメン名	BV+IFL		癌種	大腸癌
解説	転移性・進行大腸癌に対する標準的化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考	IFL：週1回の頻度で4回連続投与の後2回休薬	催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg	30-90分で点滴	day1
イリノテカン		125mg/m ²	90分で点滴	day1,8
レボホリナート		10mg/m ²	全開で点滴	day1,8
フルオロウラシル		500mg/m ²	全開で点滴	day1,8
				day1,8

レジメン名	Bieweekly・CPT-11+ベバシズマブ単剤（大腸癌・進行・		癌種	大腸癌
解説	大腸癌に対する化学療法の1つで、2nd、3rd lineで多用されている。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
イリノテカン		150mg/m ²	90分で点滴	day1
アバスチン		5mg/kg	30-90分で点滴	day1

レジメン名	パニツムマブ+sLV5FU		癌種	大腸癌
解説	大腸癌の標準的治療の1つ	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パニツムマブ		6mg/kg	60-90分	day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分	day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	全開	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間	day1

レジメン名	パニツムマブ+FOLFOX（大腸癌・進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌
解説	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パニツムマブ		6mg/kg	60-90分で点滴	day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1
オキサリプラチン		85mg/m ²	120分で点滴	day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1

レジメン名	パニツムマブ+FOLFIRI（大腸癌・進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌
解説	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パニツムマブ		6mg/kg	60-90分で点滴	day1
レボホリナート		200mg/m ²	120分で点滴	day1
イリノテカン		150mg/m ²	90分で点滴	day1
フルオロウラシル		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1

レジメン名	パニツムマブ+Biweekly CPT-11（大腸癌・進行・再発大腸		癌種	大腸癌
解説 備考	大腸癌に対する化学療法の一つで、2nd、3rd lineで多用されている	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
パニツムマブ		6mg/kg	60-90分	day1
イリノテカン		150mg/m ²	90分（遮光）	day1
レジメン名	セツキシマブ+sLV5FU（大腸癌）		癌種	大腸癌
解説 備考	大腸癌の標準的治療の一つ	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）・（2回目以降）		400・250mg/m ²	120分・60分で点滴	day1（初回）・day1,8
		200mg/m ²	120分で点滴	day1
レボホリナート		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1
レジメン名	セツキシマブ+FOLFOX（大腸癌・進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）・（2回目以降）		400・250mg/m ²	120分・60分で点滴	day1（初回）・day1,8
		200mg/m ²	120分で点滴	day1
レボホリナート		85mg/m ²	120分で点滴	day1
オキサリプラチン		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1
レジメン名	セツキシマブ+FOLFIRI（大腸癌・進行・再発大腸癌）		癌種	大腸癌
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）・（2回目以降）		400・250mg/m ²	120分・60分で点滴	day1（初回）・day1,8
		200mg/m ²	120分で点滴	day1
レボホリナート		150mg/m ²	90分で点滴	day1
イリノテカン		400mg/m ²	全開で点滴	day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²	46時間で点滴	day1
レジメン名	セツキシマブ+CPT-11（大腸癌）		癌種	大腸癌
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
	過敏症予防のため前投薬(ジフェンヒドラミン)を行う。	中		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール
セツキシマブ（初回）		400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）
セツキシマブ（2回目以降）		250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）,day8
イリノテカン		150mg/m ²	90分で点滴	day1

レジメン名		BV+SOX		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容		
				S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
			催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後 【day1		
		中		夕-15朝】		
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		7.5mg/kg		30-90分で点滴		day1
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴		day1

レジメン名		BV+CAP		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対し有効性が示されているレジメンの一つ。		1コース	内服・その他内容		
			21日	カペシタビン：体表面積1.36未満で2400mg/day、		
			催吐リスク	1.36-1.66で3000mg/day、1.66-1.96で		
		軽		3600mg/day、1.96以上で4200mg/day 経口分2		
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		7.5mg/kg		30-90分で点滴		day1

レジメン名		IRIS+BV		癌種	大腸癌	
解説 備考	切除不能進行・再発大腸癌 2 nd line以降で推奨される化学療法		1コース	内服・その他内容		
	の1つ。		28日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で		
			催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後 【day1		
		中		夕-15朝】		
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イリノテカン		125mg/m ²		90分で点滴		day1,15
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1,15

レジメン名		BV+トリフルリジン・チピラシル		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する有効性が証明されているレジメン。		1コース	内服・その他内容		
			28日	トリフルリジン・チピラシル 体表面積に応じて投与量を		
			催吐リスク	決定		
		中		経口分2 day1-5,8-12		
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1,15

レジメン名		BV+sLV5FU2		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌の標準的治療の1つ。		1コース	内服・その他内容		
			14日	ベバシズマブの投与量は初回5mg/kg、効果不十分の時は		
			催吐リスク	2回目以降10mg/kgに増量可能。		
		軽				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1
レボホリナート		200mg/m ²		120分で点滴		day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		全開で点滴		day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		46時間で点滴		day1

レジメン名		BV+SOX（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	進行・再発大腸癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容			
		21日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で			
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後			
		中	【day1夕-15朝】			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1
オキサリプラチン		130mg/m ²		120分で点滴		day1

レジメン名		BV+IRIS（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	切除不能進行・再発大腸癌 2nd line以降で推奨される化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容			
		28日	S-1：体表面積1.25未満で80mg/day、1.25～1.5で			
		催吐リスク	100mg/day、1.5以上で120mg/day 分2食後			
		中	【day1夕-15朝】			
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1,15
イリノテカン		125mg/m ²		90分で点滴		day1,15

レジメン名		BV+Biweekly CPT-11（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	大腸癌に対する化学療法の1つで、2nd,3rd Lineで多用される。	1コース	内服・その他内容			
		14日	ベバシズマブの投与量は初回5mg/kg、効果不十分の場合は2回目以降10mg/kgに増量可			
		催吐リスク	は2回目以降10mg/kgに増量可			
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ベバシズマブ		5mg/kg		30-90分で点滴		day1
イリノテカン		150mg/m ²		90分で点滴		day1

レジメン名		PER+HER（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん	1コース	内服・その他内容			
		21日				
		催吐リスク				
		最小				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ペルツズマブ（初回）		840mg/body		60分で点滴		day1（初回）
ペルツズマブ（2回目以降）		420mg/body		30分で点滴		day1（2回目以降）
トラスツズマブ（初回）		8mg/kg		90分で点滴		day1（初回）
トラスツズマブ（2回目以降）		4mg/kg		30分で点滴		day1（2回目以降）

レジメン名		2週毎 セツキシマブ+CPT-11（大腸癌）		癌種	大腸癌	
解説 備考	EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌および頭頸部癌に使用が認められたため。	1コース	内服・その他内容			
		14日				
		催吐リスク				
		中				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
セツキシマブ		500mg/m ²		120分で点滴		day1
イリノテカン		150mg/m ²		90分で点滴		day1

レジメン名	2週毎 セツキシマブ（大腸癌）		癌種	大腸癌
解説	EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌および頭頸部癌に使用が認められたため。	1コース	内服・その他内容	
備考		14日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ	500mg/m ²	120分で点滴	day1	
レジメン名	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ		癌種	大腸癌
解説	BRAFV600E変異大腸癌の2次治療以降の標準療法のため	1コース	内服・その他内容	
備考		7日	エンコラフェニブ 300mg/body 経口分1 day1より連日	
		催吐リスク	ビニメチニブ 90mg/body 経口分2 day1より連日	
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ（初回）	400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）	
セツキシマブ（2回目以降）	250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）	
レジメン名	セツキシマブ+エンコラフェニブ		癌種	大腸癌
解説	BRAFV600E変異大腸癌の2次治療以降の標準療法のため	1コース	内服・その他内容	
備考		7日	エンコラフェニブ 300mg/day 経口 分1 day1-連日	
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ（初回）	400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）	
セツキシマブ（2回目以降）	250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）	
レジメン名	セツキシマブ単剤（大腸癌）		癌種	大腸癌
解説	進行・再発大腸癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
備考	過敏症予防のため前投薬(ジフェンヒドラミン)を行う。	7日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ（初回）	400mg/m ²	120分で点滴	day1（初回）	
セツキシマブ（2回目以降）	250mg/m ²	60分で点滴	day1（2回目以降）	
レジメン名	BV+sLV5FU2		癌種	大腸癌
解説	大腸癌の標準的治療の一つ。	1コース	内服・その他内容	
備考		14日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ペバシズマブ	5mg/kg	30-90分で点滴	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	120mgで点滴	day1	
フルオロウラシル	400mg/m ²	全開で点滴	day1	
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間で点滴	day1	