

## 泌尿器

| レジメン名    |                      | テムシロリムス（腎細胞癌） |          | 癌種     | 腎細胞癌     |
|----------|----------------------|---------------|----------|--------|----------|
| 解説<br>備考 | 転移性腎細胞癌の標準的分子標的薬治療法。 | 1コース          | 内服・その他内容 |        |          |
|          |                      | 7日            |          |        |          |
|          | 催吐リスク                |               |          |        |          |
|          | 軽                    |               |          |        |          |
| 薬剤名      |                      | 投与量           |          | 手技     | 投与スケジュール |
| テムシロリムス  |                      | 25mg/body     |          | 60分で点滴 | day1     |

| レジメン名           |             | ニボルマブ+イピリムマブ（腎細胞癌）   |          | 癌種               | 腎細胞癌         |
|-----------------|-------------|----------------------|----------|------------------|--------------|
| 解説<br>備考        | 転移性腎細胞癌の治療法 | 1コース                 | 内服・その他内容 |                  |              |
|                 |             | 21日                  |          |                  |              |
|                 | 催吐リスク       |                      |          |                  |              |
|                 | 最小          |                      |          |                  |              |
| 薬剤名             |             | 投与量                  |          | 手技               | 投与スケジュール     |
| ニボルマブ<br>イピリムマブ |             | 240mg/body<br>1mg/kg |          | 30分で点滴<br>30分で点滴 | day1<br>day1 |

| レジメン名    |                                         | ペムブロリズマブ+アキシチニブ |                                                                                  | 癌種     | 腎細胞癌     |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 解説<br>備考 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対するペムブロリズマブ+アキシチニブ併用療法 | 1コース            | 内服・その他内容<br>アキシチニブ 10mg/body 経口分2 day1-連日<br>忍容性に応じ2週間毎に14mg/body、20mg/bodyまで増量可 |        |          |
|          |                                         | 21日             |                                                                                  |        |          |
|          | 催吐リスク                                   |                 |                                                                                  |        |          |
|          | 軽                                       |                 |                                                                                  |        |          |
| 薬剤名      |                                         | 投与量             |                                                                                  | 手技     | 投与スケジュール |
| ペムブロリズマブ |                                         | 200mg/body      |                                                                                  | 30分で点滴 | day1     |

| レジメン名    |                   | ニボルマブ（腎細胞癌） |          | 癌種     | 腎細胞癌     |
|----------|-------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 解説<br>備考 | 転移性腎細胞癌の化学療法のひとつ。 | 1コース        | 内服・その他内容 |        |          |
|          |                   | 14日         |          |        |          |
|          | 催吐リスク             |             |          |        |          |
|          | 最小                |             |          |        |          |
| 薬剤名      |                   | 投与量         |          | 手技     | 投与スケジュール |
| ニボルマブ    |                   | 240mg/body  |          | 30分で点滴 | day1     |

|          |                   |                 |          |    |          |
|----------|-------------------|-----------------|----------|----|----------|
| レジメン名    |                   | 4週毎 ニボルマブ（腎細胞癌） |          | 癌種 | 腎細胞癌     |
| 解説<br>備考 | 転移性腎細胞癌の化学療法のひとつ。 | 1コース            | 内服・その他内容 |    |          |
|          |                   | 28日             |          |    |          |
|          |                   | 催吐リスク           |          |    |          |
|          |                   | 最小              |          |    |          |
| 薬剤名      |                   | 投与量             | 手技       |    | 投与スケジュール |
| ニボルマブ    |                   | 480mg/body      | 30分で点滴   |    | day1     |

|          |                 |                           |                                       |    |          |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----------|
| レジメン名    |                 | 3週毎 ヘムブロリズマブ+レンバチニブ（腎細胞癌） |                                       | 癌種 | 腎細胞癌     |
| 解説<br>備考 | 腎細胞癌の適応が追加されたため | 1コース                      | 内服・その他内容<br>レンバチニブ 20mg/body 経口 分1 連日 |    |          |
|          |                 | 21日                       |                                       |    |          |
|          |                 | 催吐リスク                     |                                       |    |          |
|          |                 | 中                         |                                       |    |          |
| 薬剤名      |                 | 投与量                       | 手技                                    |    | 投与スケジュール |
| ペムブロリズマブ |                 | 200mg/body                | 30分で点滴                                |    | day1     |

|          |                |                           |                                       |    |          |
|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----------|
| レジメン名    |                | 6週毎 ヘムブロリズマブ+レンバチニブ（腎細胞癌） |                                       | 癌種 | 腎細胞癌     |
| 解説<br>備考 | 子宮体癌の2次治療のひとつ。 | 1コース                      | 内服・その他内容<br>レンバチニブ 20mg/body 経口 分1 連日 |    |          |
|          |                | 42日                       |                                       |    |          |
|          |                | 催吐リスク                     |                                       |    |          |
|          |                | 中                         |                                       |    |          |
| 薬剤名      |                | 投与量                       | 手技                                    |    | 投与スケジュール |
| ペムブロリズマブ |                | 400mg/body                | 30分で点滴                                |    | day1     |

|          |                              |                   |                                       |    |          |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----------|
| レジメン名    |                              | 2週毎 ニボルマブ+カボザンチニブ |                                       | 癌種 | 腎細胞癌     |
| 解説<br>備考 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に有効性が認められたため | 1コース              | 内服・その他内容<br>カボザンチニブ 40mg 経口 分1 空腹時 連日 |    |          |
|          |                              | 14日               |                                       |    |          |
|          |                              | 催吐リスク             |                                       |    |          |
|          |                              | 軽度                |                                       |    |          |
| 薬剤名      |                              | 投与量               | 手技                                    |    | 投与スケジュール |
| ニボルマブ    |                              | 240mg/body        | 30分で点滴                                |    | day1     |

|          |                              |                   |                                       |    |          |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----------|
| レジメン名    |                              | 4週毎 ニボルマブ+カボザンチニブ |                                       | 癌種 | 腎細胞癌     |
| 解説<br>備考 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に有効性が認められたため | 1コース              | 内服・その他内容<br>カボザンチニブ 40mg 経口 分1 空腹時 連日 |    |          |
|          |                              | 28日               |                                       |    |          |
|          |                              | 催吐リスク             |                                       |    |          |
|          |                              | 軽度                |                                       |    |          |
| 薬剤名      |                              | 投与量               | 手技                                    |    | 投与スケジュール |
| ニボルマブ    |                              | 480mg/body        | 30分で点滴                                |    | day1     |

|       |                                      |        |                                     |      |
|-------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|
| レジメン名 | アベルマブ+アキシチニブ                         |        | 癌種                                  | 腎細胞癌 |
| 解説    | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対するアベルマブ+アキシチニブ併用療法 | 1コース   | 内服・その他内容                            |      |
|       |                                      | 14日    | アキシチニブ 10mg/body 経口分2 day1-連日       |      |
| 備考    |                                      | 催吐リスク  | 忍容性に応じ2週間毎に14mg/body、20mg/bodyまで増量可 |      |
|       |                                      | 軽      |                                     |      |
| 薬剤名   | 投与量                                  | 手技     | 投与スケジュール                            |      |
| アベルマブ | 10mg/kg                              | 60分で点滴 | day1                                |      |

|         |                      |        |           |     |
|---------|----------------------|--------|-----------|-----|
| レジメン名   | BEP                  |        | 癌種        | 精巣癌 |
| 解説      | 精巣癌の標準的導入化学療法。       | 1コース   | 内服・その他内容  |     |
|         |                      | 21日    |           |     |
| 備考      |                      | 催吐リスク  |           |     |
|         |                      | 高      |           |     |
| 薬剤名     | 投与量                  | 手技     | 投与スケジュール  |     |
| シスプラチン  | 20mg/m <sup>2</sup>  | 2時間で点滴 | day1-5    |     |
| エトポシド   | 100mg/m <sup>2</sup> | 1時間で点滴 | day1-5    |     |
| ブレオマイシン | 20mg/m <sup>2</sup>  | 30分で点滴 | day2,9,16 |     |

|         |                           |        |           |      |
|---------|---------------------------|--------|-----------|------|
| レジメン名   | Weekly PTX（ホルモン抵抗性前立腺癌）   |        | 癌種        | 前立腺癌 |
| 解説      | ホルモン抵抗性前立腺癌に対する汎用化学療法の1つ。 | 1コース   | 内服・その他内容  |      |
|         |                           | 28日    |           |      |
| 備考      |                           | 催吐リスク  |           |      |
|         |                           | 軽      |           |      |
| 薬剤名     | 投与量                       | 手技     | 投与スケジュール  |      |
| パクリタキセル | 90mg/m <sup>2</sup>       | 60分で点滴 | day1,8,15 |      |

|        |                               |        |          |      |
|--------|-------------------------------|--------|----------|------|
| レジメン名  | Triweekly High dose DTX（前立腺癌） |        | 癌種       | 前立腺癌 |
| 解説     | 前立腺癌に対する化学療法の1つ。              | 1コース   | 内服・その他内容 |      |
|        |                               | 21日    |          |      |
| 備考     |                               | 催吐リスク  |          |      |
|        |                               | 軽      |          |      |
| 薬剤名    | 投与量                           | 手技     | 投与スケジュール |      |
| ドセタキセル | 75mg/m <sup>2</sup>           | 60分で点滴 | day1     |      |

|        |                             |        |                                                  |      |
|--------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|------|
| レジメン名  | DARO+DTX+ADT                |        | 癌種                                               | 前立腺癌 |
| 解説     | 遠隔転移を有する前立腺癌に対して適応が認められたため。 | 1コース   | 内服・その他内容                                         |      |
|        |                             | 21日    | ダロルタミド：1200mg/body 経口分2食後                        |      |
| 備考     |                             | 催吐リスク  | アンドロゲン遮断療法：LH-RHアナログ or LH-RH アンタゴニスト 1-6ヶ月毎 皮下注 |      |
|        |                             | 軽      |                                                  |      |
| 薬剤名    | 投与量                         | 手技     | 投与スケジュール                                         |      |
| ドセタキセル | 75mg/m <sup>2</sup>         | 60分で点滴 | day1                                             |      |

|                   |                                |                                               |                   |                |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| レジメン名             | Triweekly High dose DTX（前立腺癌）  |                                               | 癌種                | 前立腺癌           |
| 解説                | ホルモン抵抗性前立腺癌、子宮体癌に対する汎用化学療法の1つ。 | 1コース                                          | 内服・その他内容          |                |
| 備考                |                                | 21日                                           |                   |                |
|                   |                                | 催吐リスク                                         |                   |                |
|                   |                                | 軽                                             |                   |                |
| 薬剤名               |                                | 投与量                                           | 手技                | 投与スケジュール       |
| ドセタキセル            |                                | 70mg/m <sup>2</sup>                           | 60分で点滴            | day1           |
| レジメン名             | カバジタキセル                        |                                               | 癌種                | 前立腺癌           |
| 解説                | 去勢抵抗性前立腺癌に対する化学療法の1つ。          | 1コース                                          | 内服・その他内容          |                |
| 備考                |                                | 21日                                           |                   |                |
|                   |                                | 催吐リスク                                         |                   |                |
|                   |                                | 軽                                             |                   |                |
| 薬剤名               |                                | 投与量                                           | 手技                | 投与スケジュール       |
| カバジタキセル           |                                | 25mg/m <sup>2</sup>                           | 60分で点滴            | day1           |
| レジメン名             | GEM+CBDCA（尿路上皮癌）               |                                               | 癌種                | 尿路上皮癌          |
| 解説                | 転移性尿路上皮癌の腎機能低下症例における化学療法       | 1コース                                          | 内服・その他内容          |                |
| 備考                |                                | 21日                                           |                   |                |
|                   |                                | 催吐リスク                                         |                   |                |
|                   |                                | 中                                             |                   |                |
| 薬剤名               |                                | 投与量                                           | 手技                | 投与スケジュール       |
| ゲムシタビン<br>カルボプラチン |                                | 1000mg/m <sup>2</sup><br>AUC=5                | 30分で点滴<br>120分で点滴 | day1,6<br>day1 |
| レジメン名             | GEM+PTX（尿路上皮癌）                 |                                               | 癌種                | 尿路上皮癌          |
| 解説                | 転移性尿路上皮癌の2次化学療法                | 1コース                                          | 内服・その他内容          |                |
| 備考                |                                | 21日                                           |                   |                |
|                   |                                | 催吐リスク                                         |                   |                |
|                   |                                | 軽                                             |                   |                |
| 薬剤名               |                                | 投与量                                           | 手技                | 投与スケジュール       |
| ゲムシタビン<br>パクリタキセル |                                | 1000mg/m <sup>2</sup><br>175mg/m <sup>2</sup> | 30分で点滴<br>180分で点滴 | day1,8<br>day1 |
| レジメン名             | 低用量CDDP（放射線併用）                 |                                               | 癌種                | 尿路上皮癌          |
| 解説                | 浸潤性尿路上皮癌                       | 1コース                                          | 内服・その他内容          |                |
| 備考                |                                | 7日                                            |                   |                |
|                   |                                | 催吐リスク                                         |                   |                |
|                   |                                | 高                                             |                   |                |
| 薬剤名               |                                | 投与量                                           | 手技                | 投与スケジュール       |
| シスプラチン            |                                | 10mg/body                                     | 12時間で点滴           | day1-5         |

|          |                    |                     |          |        |       |          |
|----------|--------------------|---------------------|----------|--------|-------|----------|
| レジメン名    |                    | MEC（尿路上皮癌）          |          | 癌種     | 尿路上皮癌 |          |
| 解説<br>備考 | 尿路上皮癌に対する化学療法のひとつ。 | 1コース                | 内服・その他内容 |        |       |          |
|          |                    | 28日                 |          |        |       |          |
|          |                    | 催吐リスク               |          |        |       |          |
|          |                    | 高                   |          |        |       |          |
| 薬剤名      |                    | 投与量                 |          | 手技     |       | 投与スケジュール |
| メトトレキサート |                    | 30mg/m <sup>2</sup> |          | 30分で点滴 |       | day1,15  |
| エピルビシン   |                    | 50mg/m <sup>2</sup> |          | 10分で点滴 |       | day1     |
| シスプラチン   |                    | 50mg/m <sup>2</sup> |          | 60分で点滴 |       | day2,3   |

|          |                      |                 |          |        |       |          |
|----------|----------------------|-----------------|----------|--------|-------|----------|
| レジメン名    |                      | ペムブロリズマブ（尿路上皮癌） |          | 癌種     | 尿路上皮癌 |          |
| 解説<br>備考 | 尿路上皮癌の2次治療の標準治療のひとつ。 | 1コース            | 内服・その他内容 |        |       |          |
|          |                      | 21日             |          |        |       |          |
|          |                      | 催吐リスク           |          |        |       |          |
|          |                      | 最小              |          |        |       |          |
| 薬剤名      |                      | 投与量             |          | 手技     |       | 投与スケジュール |
| ペムブロリズマブ |                      | 200mg/body      |          | 30分で点滴 |       | day1     |

|          |                    |                     |          |        |       |          |
|----------|--------------------|---------------------|----------|--------|-------|----------|
| レジメン名    |                    | 6週毎 ペムブロリズマブ（尿路上皮癌） |          | 癌種     | 尿路上皮癌 |          |
| 解説<br>備考 | 尿路上皮癌に対する二次治療のひとつ。 | 1コース                | 内服・その他内容 |        |       |          |
|          |                    | 42日                 |          |        |       |          |
|          |                    | 催吐リスク               |          |        |       |          |
|          |                    | 最小                  |          |        |       |          |
| 薬剤名      |                    | 投与量                 |          | 手技     |       | 投与スケジュール |
| ペムブロリズマブ |                    | 400mg/body          |          | 30分で点滴 |       | day1     |

|          |                 |             |          |        |       |          |
|----------|-----------------|-------------|----------|--------|-------|----------|
| レジメン名    |                 | アベルマブ（尿路上皮） |          | 癌種     | 尿路上皮癌 |          |
| 解説<br>備考 | 尿路上皮がん癌の治療法の一つ。 | 1コース        | 内服・その他内容 |        |       |          |
|          |                 | 14日         |          |        |       |          |
|          |                 | 催吐リスク       |          |        |       |          |
|          |                 | 最小          |          |        |       |          |
| 薬剤名      |                 | 投与量         |          | 手技     |       | 投与スケジュール |
| アベルマブ    |                 | 10mg/kg     |          | 60分で点滴 |       | day1     |

|                         |                                       |                     |          |        |       |           |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|-----------|
| レジメン名                   |                                       | エンホルツマブ ベドチン（尿路上皮癌） |          | 癌種     | 尿路上皮癌 |           |
| 解説<br>備考                | 癌化学療法後に増悪した根治切除不能の尿路上皮癌に適応<br>拡大されたため | 1コース                | 内服・その他内容 |        |       |           |
|                         |                                       | 28日                 |          |        |       |           |
|                         |                                       | 催吐リスク               |          |        |       |           |
| PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴が必要！ |                                       | 軽                   |          |        |       |           |
| 薬剤名                     |                                       | 投与量                 |          | 手技     |       | 投与スケジュール  |
| エンホルツマブ ベドチン            |                                       | 1.25mg/kg           |          | 30分で点滴 |       | day1,8,15 |

|              |                         |                                    |          |          |  |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|--|
| レジメン名        | ペムブロリズマブ+エンホルツマブ ベドチン療法 |                                    | 癌種       | 尿路上皮癌    |  |
| 解説<br>備考     | 根治切除不能の尿路上皮癌に適応追加された    | 1コース                               | 内服・その他内容 |          |  |
|              |                         | 21日                                |          |          |  |
|              |                         | 催吐リスク                              |          |          |  |
|              |                         | 軽                                  |          |          |  |
| 薬剤名          |                         | 投与量                                | 手技       | 投与スケジュール |  |
| エンホルツマブ ベドチン |                         | 1.25mg/kg (max125mg)<br>200mg/body | 30分      | day1,8   |  |
| キイトルーダ       |                         |                                    | 30分      | day1     |  |

|          |                        |                      |          |          |  |
|----------|------------------------|----------------------|----------|----------|--|
| レジメン名    | EDP（副腎皮質癌）             |                      | 癌種       | 副腎皮質癌    |  |
| 解説<br>備考 | 進行転移性副腎皮質癌に対する化学療法の1つ。 | 1コース                 | 内服・その他内容 |          |  |
|          |                        | 28日                  |          |          |  |
|          |                        | 催吐リスク                |          |          |  |
|          |                        | 高                    |          |          |  |
| 薬剤名      |                        | 投与量                  | 手技       | 投与スケジュール |  |
| ドキシソルビシン |                        | 20mg/m <sup>2</sup>  | 全開で点滴    | day1,8   |  |
| シスプラチン   |                        | 40mg/m <sup>2</sup>  | 90分で点滴   | day2,9   |  |
| エトポシド    |                        | 100mg/m <sup>2</sup> | 90分で点滴   | day5-7   |  |

|          |                      |                     |          |            |  |
|----------|----------------------|---------------------|----------|------------|--|
| レジメン名    | M-VAC（膀胱癌）           |                     | 癌種       | 膀胱癌        |  |
| 解説<br>備考 | 進行・再発膀胱癌に対する標準的化学療法。 | 1コース                | 内服・その他内容 |            |  |
|          |                      | 28日                 |          |            |  |
|          |                      | 催吐リスク               |          |            |  |
|          |                      | 高                   |          |            |  |
| 薬剤名      |                      | 投与量                 | 手技       | 投与スケジュール   |  |
| メトトレキサート |                      | 30mg/m <sup>2</sup> | 全開で点滴    | day1,15,22 |  |
| ビンブラスチン  |                      | 3mg/m <sup>2</sup>  | 全開で点滴    | day2,15,22 |  |
| ドキシソルビシン |                      | 30mg/m <sup>2</sup> | 全開で点滴    | day2       |  |
| シスプラチン   |                      | 70mg/m <sup>2</sup> | 60分で点滴   | day2       |  |

|          |                       |                       |          |          |  |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|--|
| レジメン名    | GC day1,8 CDDP分割（膀胱癌） |                       | 癌種       | 膀胱癌      |  |
| 解説<br>備考 | 膀胱癌に対する標準的化学療法の1つ。    | 1コース                  | 内服・その他内容 |          |  |
|          |                       | 21日                   |          |          |  |
|          |                       | 催吐リスク                 |          |          |  |
|          |                       | 高                     |          |          |  |
| 薬剤名      |                       | 投与量                   | 手技       | 投与スケジュール |  |
| ゲムシタビン   |                       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 30分で点滴   | day1,8   |  |
| シスプラチン   |                       | 35mg/m <sup>2</sup>   | 60分で点滴   | day1,8   |  |

|          |                              |                       |          |           |  |
|----------|------------------------------|-----------------------|----------|-----------|--|
| レジメン名    | GC（膀胱癌）                      |                       | 癌種       | 膀胱癌       |  |
| 解説<br>備考 | 毒性を考慮した進行再発膀胱癌に対する汎用化学療法の1つ。 | 1コース                  | 内服・その他内容 |           |  |
|          |                              | 28日                   |          |           |  |
|          |                              | 催吐リスク                 |          |           |  |
|          |                              | 高                     |          |           |  |
| 薬剤名      |                              | 投与量                   | 手技       | 投与スケジュール  |  |
| ゲムシタビン   |                              | 1000mg/m <sup>2</sup> | 30分で点滴   | day1,8,15 |  |
| シスプラチン   |                              | 70mg/m <sup>2</sup>   | 120分で点滴  | day2      |  |

|          |                                   |                       |       |          |           |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|
| レジメン名    |                                   | GEM（膀胱癌）              |       | 癌種       | 膀胱癌       |
| 解説<br>備考 | 膀胱癌、胆癌、膀胱癌、卵巣癌、悪性リンパ腫に対する化学療法の一つ。 |                       | 1コース  | 内服・その他内容 |           |
|          |                                   |                       | 28日   |          |           |
|          |                                   |                       | 催吐リスク |          |           |
|          |                                   |                       | 軽     |          |           |
| 薬剤名      |                                   | 投与量                   |       | 手技       | 投与スケジュール  |
| ゲムシタビン   |                                   | 1000mg/m <sup>2</sup> |       | 30分で点滴   | day1,8,15 |

|          |                    |                            |                |          |          |     |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------|----------|----------|-----|
| レジメン名    |                    |                            | GC day1,8（膀胱癌） |          | 癌種       | 膀胱癌 |
| 解説<br>備考 | 膀胱癌に対する標準的化学療法の1つ。 |                            | 1コース           | 内服・その他内容 |          |     |
|          |                    |                            | 21日            |          |          |     |
|          |                    |                            | 催吐リスク          |          |          |     |
|          |                    |                            | 高              |          |          |     |
| 薬剤名      |                    | 投与量                        |                | 手技       | 投与スケジュール |     |
| ゲムシタビン   |                    | 1000-1250mg/m <sup>2</sup> |                | 30分で点滴   | day1,8   |     |
| シスプラチン   |                    | 70mg/m <sup>2</sup>        |                | 60分で点滴   | day1     |     |

|          |                                              |                     |        |                                           |          |     |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------|----------|-----|
| レジメン名    |                                              |                     | ddMVAC |                                           | 癌種       | 膀胱癌 |
| 解説<br>備考 | 膀胱癌に対する標準的化学療法。<br>6コースまで。CCr≥50mL/minであること。 |                     | 1コース   | 内服・その他内容<br>フィルグラスチム 75μg/day 皮下注【day3-9】 |          |     |
|          |                                              |                     | 14日    |                                           |          |     |
|          |                                              |                     | 催吐リスク  |                                           |          |     |
|          |                                              |                     | 高      |                                           |          |     |
| 薬剤名      |                                              | 投与量                 |        | 手技                                        | 投与スケジュール |     |
| メソトレキセート |                                              | 30mg/m <sup>2</sup> |        | 全開で点滴                                     | day1     |     |
| ビンブラスチン  |                                              | 3mg/m <sup>2</sup>  |        | 全開で点滴                                     | day2     |     |
| ドキシソルビシン |                                              | 30mg/m <sup>2</sup> |        | 全開で点滴                                     | day2     |     |
| シスプラチン   |                                              | 70mg/m <sup>2</sup> |        | 60分で点滴                                    | day2     |     |