

皮膚

レジメン名		4週毎 ニボルマブ（悪性黒色腫）		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	化学療法未治療・既治療の根治切除不能な悪性黒色腫	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		6週毎 ペムブロリズマブ（悪性黒色腫）		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	悪性黒色腫に対する治療のひとつ。 術後療法の場合投与期間は12ヶ月まで。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムブロリズマブ		400mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		ニボルマブ+イピリムマブ（悪性黒色腫）		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	根治切除不能な悪性黒色腫の治療法	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ニボルマブ イピリムマブ		80mg/body 3mg/kg	30分で点滴 90分で点滴		day1 day1

レジメン名		ペムブロリズマブ（悪性黒色腫）		癌種	悪性黒色腫
解説 備考	悪性黒色腫の治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body	30分で点滴		day1

レジメン名		ニボルマブ（悪性黒色腫）		癌種	悪性黒色腫	
解説 備考	化学療法未治療・既治療の根治切除不能な悪性黒色腫	1コース		内服・その他内容		
		14日				
		催吐リスク				
		最小				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body		30分で点滴		day1

レジメン名		イピリムマブ		癌種	悪性黒色腫	
解説 備考	根治切除不能な悪性黒色腫の治療法	1コース		内服・その他内容		
		21日				
		催吐リスク				
		最小				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
イピリムマブ		3mg/kg		90分で点滴		day1

レジメン名		低用量ニボルマブ		癌種	悪性黒色腫	
解説 備考	化学療法既治療の根治切除不能な悪性黒色腫	1コース		内服・その他内容		
		21日				
		催吐リスク				
		最小				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ニボルマブ		2mg/kg		60分で点滴		day1

レジメン名		ダカルバジン		癌種	悪性黒色腫	
解説 備考	悪性黒色腫に対するレジメン	1コース		内服・その他内容		
		21日				
		催吐リスク				
		高				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ダカルバジン		1000mg/m ²		60分で点滴		day1

レジメン名		DAV-Feron（悪性黒色腫）		癌種	悪性黒色腫	
解説 備考	悪性黒色腫の標準的治療の1つ。	1コース		内服・その他内容		
		28日				
		催吐リスク				
		高				
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール
ニムスチン		60mg/m ²		30分で点滴		day1
ピンクリスチン		0.6mg/m ²		10分で点滴		day1
ダカルバジン		120mg/m ²		60分で点滴		day1-5
インターフェロンベータ		300万単位		皮下注		day1-5

レジメン名		アベルマブ（メルケル細胞腫）		癌種	メルケル細胞腫
解説	メルケル細胞腫の治療法の一つ。		1コース	内服・その他内容	
			14日		
備考	アベルマブ投与30分前にジフェンヒドラミン10mg×5錠、アセトアミノフェン300mg×2錠を投与する。		催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
アベルマブ		10mg/kg		60分で点滴	day1

レジメン名		デニロイキン　ジフチトクス		癌種	皮膚T細胞性リンパ腫、末梢性T細胞リン
解説	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫、再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫。		1コース	内服・その他内容	
			21日		
備考			催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
デニロイキン　ジフチトクス		9μg/kg		60分で点滴	day1-5