

膠原病

レジメン名		リツキシマブ（多発血管炎性肉芽腫症・顕微鏡的多発血管炎）		癌種	多発血管炎
解説 備考	多発血管炎性肉芽腫症・顕微鏡的多発血管炎に対する分子標的治療。 リツキシマブに対し、前投薬(ロキソプロフェンNa・ミソプロストール・クロルフェニラミン)を行う。	1コース	内服・その他内容		
		7日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
リツキシマブ		375mg/m ²	2-3時間で点滴		day1
レジメン名		インフリキシマブ（クローン病、潰瘍性大腸炎）		癌種	クローン病・潰瘍性大腸炎
解説 備考	クローン病、潰瘍性大腸炎に対する抗体療法の1つ。 初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔で投与を行う。	1コース	内服・その他内容		
		催吐リスク			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
インフリキシマブ		5mg/kg	120分で点滴		day1,15,43,99…
レジメン名		ベリムマブ（SLE）		癌種	全身性エリテマトーデス
解説 備考	既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス 4サイクル目以降4週間で投与	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
ベリムマブ		10mg/kg	60分で点滴		day1
レジメン名		トシリズマブ（特発性関節炎、成人スチル病、キャッスルマン病）		癌種	特発性関節炎、成人スチル病、キャッスル
解説 備考	特発性関節炎、成人スチル病、キャッスルマン病 症状に応じ7日に短縮可能	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
トシリズマブ		8mg/kg	60分で点滴		day1

レジメン名		エンドキサンプルス（治療抵抗性リウマチ性疾患）		癌種	治療抵抗性リウマチ性疾患
解説 備考	治療抵抗性リウマチ性疾患に使用する。	1コース	内服・その他内容		
		14-28日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
シクロホスファミド		750mg/m ²	180分で点滴		day1

レジメン名		トシリズマブ（関節リウマチ）		癌種	関節リウマチ
解説 備考	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
トシリズマブ		8mg/kg	60分で点滴		day1

レジメン名		アバタセプト（関節リウマチ）		癌種	関節リウマチ
解説 備考	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	1コース	内服・その他内容		
		28日			
		催吐リスク			
初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間隔					
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
アバタセプト		60kg未満：500mg 60-100kg：750mg 100kg異常：1000mg	30分で点滴		day1,15,29,57…

レジメン名		インフリキシマブ（関節リウマチ）		癌種	関節リウマチ
解説 備考	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	1コース	内服・その他内容		
		56日			
		催吐リスク			
初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔			6週の投与以後、1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mgとする。また、最短の投与間隔は4週間		
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
インフリキシマブ		3-10mg/kg	120分で点滴		day1,15,43,99…

レジメン名		インフリキシマブ（関節症性乾癬）		癌種	関節症性乾癬
解説 備考	既存治療で効果不十分な関節症性乾癬	1コース	内服・その他内容		
		56日			
		催吐リスク			
初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔			6週の投与以後、1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mgとする。また、最短の投与間隔は4週間		
薬剤名		投与量	手技		投与スケジュール
インフリキシマブ		5-10mg/kg	120分で点滴		day1,15,43,99…

レジメン名		インフリキシマブ（強直性脊椎炎）		癌種	強直性脊椎炎
解説	既存治療	で効果不十分な強直性脊椎炎		1コース	内服・その他内容
				56日	
備考	初回投与後、2週、6週に投与し、以後6-8週間隔			催吐リスク	
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
インフリキシマブ		5mg/kg		120分で点滴	day1,15,43,99…

レジメン名		R（天疱瘡）		癌種	天疱瘡
解説	難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡	1コース		内服・その他内容	
		14日			
備考	2コースまで	催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
リツキシマブ		1000mg/body		5-7時間で点滴	day1